CNPF
Centre Régional
de la Propriété Forestière
NOUVELLE-AQUITAINE

DEUX-SÈVRES
LE DÉPARTEMENT

# Aménagement foncier sur l'Airvaudais :

## Diagnostic sylvicole des massifs de Saint Généroux, d'Irais, des Patelières, de la Praire et de Moiré

Février 2019

# SOMMAIRE


**INTRODUCTION** ..... 1

**LA FORET DE SAINT GENEROUX** ..... 1

- **TAILLIS A DOMINANCE DE CHENE** ..... 1
- **TAILLIS DE ROBINIER** ..... 3
- **MELANGE TAILLIS DE CHARME ET CHENE** ..... 4
- **MELANGES TAILLIS FUTAIE DE CHENE** ..... 4
- **MELANGE TAILLIS FUTAIE DE PIN SYLVESTRE ET CHENE** ..... 5

***INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES*** ..... 5

**CONCLUSION** ..... 6

**LA FORET D'IRAIS** ..... 7

- **TAILLIS A DOMINANCE CHENE** ..... 7
- **TAILLIS DE ROBINIER** ..... 9
- **TAILLIS DE CHATAIGNIER** ..... 10
- **TAILLIS DE CHENE ROUGE D'AMERIQUE** ..... 11

***INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES*** ..... 11

**CONCLUSION** ..... 12

**LE BOIS DES PATELIERES** ..... 13

- **TAILLIS DE ROBINIER** ..... 13
- **MELANGE TAILLIS FUTAIE DE CHENE, FRENE ET ROBINIER** ..... 14
- **TAILLIS DE CHENE** ..... 14
- **MELANGE DE TAILLIS ROBINIER-CHENE** ..... 15
- **FUTAIE DE CHENE** ..... 15

**CONCLUSION** ..... 15

**LE BOIS DE LA PRAIRE** ..... 16

- **TAILLIS DE CHENE** ..... 16
- **TAILLIS DE ROBINIER** ..... 17

***INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES*** ..... 17

**CONCLUSION** ..... 17

**LE BOIS DE MOIRE** ..... 18

- **MELANGE TAILLIS FUTAIE DE CHENE ET ROBINIER** ..... 18
- **TAILLIS DE ROBINIER** ..... 19
- **MELANGE DE TAILLIS DIVERS** ..... 19

**CONCLUSION** ..... 20


**CONCLUSION DE L'ETUDE** ..... 21

**LISTES DES ANNEXES** ..... 23

# Introduction

Suite à l'étude engagée par le Département des Deux-Sèvres et le CRPF sur les communes d'Airvaux, d'Irais, d'Availles-Thouarsais et de Saint Généroux, depuis 2015, un projet d'aménagement foncier a été validé par ces différentes communes.

Les massifs présélectionnés sont les suivants :





Ce document de synthèse s'attache à décrire les peuplements forestiers présélectionnés.

Il s'agit de décrire les différents types de peuplements (taillis, futaie, mélange taillis futaie…), les essences présentent (chêne, châtaignier…), la qualité des bois en lien avec la station forestière, ainsi que le potentiel des bois présents. La notion d'amélioration des boisements sera également développée. Un boisement avec du potentiel peut bénéficier d'une coupe d'amélioration (aussi appelée éclaircie) ce qui augmentera sa valeur d'avenir. Il s'agit généralement d'un plus quand des peuplements sont améliorables (bénéfice d'une coupe pour le propriétaire sans réinvestissement).

# La forêt de Saint Généroux

Les peuplements présents sur la forêt se déclinent de la façon suivante :




Ces peuplements se présentent de la manière suivante (*voir carte en annexe*) :

- **Taillis à dominance de chêne**

**Description :**

Le taillis de chêne est le peuplement le plus représenté sur le massif. Il est pur à 90% et est principalement accompagné de robinier et de merisier.

Les chênes sont majoritairement tortueux, branchus et certains sont gélifs.



*Photo 2 : Taillis de  chêne*



*Photo 1 : Noisetier*

Par ailleurs, comme nous nous trouvons sur des sols calcaires, peu profonds, leur croissance est lente. Cette constatation est accentuée lorsqu'il y a de la pente où on retrouve des sols très superficiels.

C'est pourquoi Il ne parait pas pertinent de les améliorer. Cependant, cette conduite en taillis permet une production de bois de qualité chauffage très intéressante.

Sur la partie haute de pente et début de plateau, au milieu de la forêt, on note la présence d'un sous-étage de noisetier. Le noisetier n'est pas une essence de production forestière mais ce dernier peut poser ponctuellement des problèmes de renouvellement des peuplements (envahissement qui concurrence la croissance des bois tels que le chêne).

Le merisier est présent de façon assez régulière sur toute la forêt.

Le robinier est plutôt une essence également présente. En effet, il est souvent mélangé dans les régénérations et de par sa croissance rapide et son caractère « colonisateur », il sera potentiellement de plus en plus présent au côté du chêne.

Enfin, on trouve également des secteurs de faible surface où le charme est présent.

Il n'est pas souhaitable d'éclaircir le charme et le robinier. En effet, ils ne sont pas assez présents.

On note aussi que les bordures de champs contiennent des réserves de chênes branchus et avec de nombreux de gourmands.

**Potentiel :**

- Production de bois de chauffage

- **Taillis de robinier**

## Description :

Les taillis de robiniers sont des taillis contenant plus de 70% de robinier. Ils sont souvent présents en bordure de champs. De plus, lorsqu'une coupe de taillis de chêne est réalisée à proximité, le robinier est présent dans la régénération (colonisateur).

Il est souvent branchu et peu droit. Par ailleurs, une petite zone sur la partie est en bas de pente est caractérisé par un dépérissement des robiniers. Il est possible que cela soit dû aux mauvaises adaptations à la station.

D'autre part certaines zones sont en mélange avec le chêne même si ce dernier reste minoritaire.

Ces peuplements ne sont pas améliorables du fait des faibles surfaces et de leur qualité moyenne.



*Photo 4 : Taillis de robinier*



*Photo 3 : Taillis de robinier dépérissant*

## Potentiel :

- Production de bois de chauffage
- Production plus limitée de bois d'industrie (type piquets)

### ➢ Mélange taillis de charme et chêne

**Description :**

Le mélange taillis de charme et chêne est très localisé sur la partie basse située en de de vallon.

En effet, le charme prend le dessus sur le chêne de part une meilleure croissance juvénile. A terme, le chêne prendra le dessus sur le charme.



*Photo 6 : Régénération*



*Photo 5 : Charme en bas de pente*

**Potentiel :**

- Production de bois de chauffage

### ➢ Mélanges taillis futaie de chêne

**Description :**

Les zones de mélange taillis futaie sont composés de chênes à 90%. La futaie est globalement de mauvaise qualité.

En effet, elle comporte des arbres branchus et brogneux. Le taillis est de même qualité que sur le reste du massif, à la fois hétérogène en densité et de qualité très modeste.

Il n'est pas souhaitable de les améliorer compte tenu de leur qualité.



*Photo 7 : Mélange taillis futaie de chêne*

**Potentiel :**

- Production du bois de chauffage

- **Mélange taillis futaie de pin sylvestre et chêne**

**Description :**

Il s'agit d'une petite zone située sur un « coteau » est composé d'une futaie de pin sylvestre avec un taillis de chêne. Les pins sylvestres sont branchus et sont peu droits. Le chêne n'est pas dense et a une croissance très lente. Cela s'explique par le fait qu'il se trouve sur une zone avec des sols très superficiels. Le peuplement s'apparente à une lande arborée.



*Photo 8 : Mélange taillis futaie de pin sylvestre et chêne*

**Potentiel :**

- Production de bois d'industrie pour les pins sylvestres (qualité trituration)
- Production de bois de chauffage pour le chêne

***Informations complémentaires***

La ronce est très présente dans les régénérations de taillis. Elle peut être accompagnée par endroit de genêt à balais tout aussi dense. Dans certains cas, elle facilite la protection des régénérations contre la grande faune.



*Photo 9 : Ronce dans les régénérations*



*Photo 10 : Taillis de chêne dans la  pente*

En se guidant avec les courbes de niveaux présentes sur la carte IGN, on peut se rendre compte à quel point certaines zones peuvent comporter une forte pente, où l'exploitation est difficile (pentes supérieures à 20 % selon l'IGN et dénivelés importants).

On note également la présence de frênes parsemés sur les zones un peu plus fraîches. Il est de qualité bois d'industrie.

# Conclusion

**Le massif de Saint Généroux couvre une surface boisée d'environ 140 ha. Le chêne est l'essence la plus présente.**

**Le taillis de chêne peut être valorisé principalement en bois de chauffage. Les réserves ne seront pas une réelle plus-value car elles sont trop peu nombreuses et de qualité souvent médiocre.**

**Le robinier peut être utilisé dans peu de cas du fait de leur rectitude en piquets sur du petit diamètre principalement (10-14 cm de diamètre). Il peut également être utilisé en bois de chauffage, tout comme le merisier.**


**Le charme et le merisier peuvent être utilisés en bois de chauffage dans la majeure partie des cas rencontrée.**

**Enfin, le pin sylvestre peut être utilisé en bois d'industrie.**

**Compte tenu des différents éléments on peut dire que les peuplements se trouvent sur des stations à qualité moyenne à faible. On peut tout de même dire que nous sommes sur une station à bon potentiel bois de chauffage.**

# La forêt d'Irais

Les peuplements se répartissent de la manière suivante :




La forêt se décompose de la façon suivante (*voir carte en annexe*) :

- **Taillis à dominante de chêne**

**Description :**

Le peuplement principal est le taillis à dominance chêne. Le chêne est accompagné principalement de châtaignier ou de robinier.

Le chêne présente différents aspects selon le secteur où il est présent.

Sur la partie sud les taillis sont souvent plus riches car les peuplements sont de meilleures qualités. Cependant, il y a une hétérogénéité au niveau de la densité des taillis.

Au centre, le taillis est très hétérogène avec des alternances de taillis droit, dense et peu branchu avec des zones vieillissantes où la densité est plus faible avec un taillis de mauvaise qualité.

Au nord, les taillis sont vieillissants et de qualité moyenne.

Il existe néanmoins de nombreuses exceptions où le chêne est plus dense mais sur de très petites surfaces. Cela nous laisse penser que le chêne est bien en station mais que la plupart des taillis ne sont pas exploités faute d'enclavement.

Il s'agit de secteurs aux potentialités forestières intéressantes mais qui ne peuvent bénéficier que difficilement de coupes d'amélioration.

Enfin, il y a des réserves de chênes présentes. La majorité d'entre elles sont en lisière et le reste sont répartis sur tout le massif.



*Photo 11 : Taillis à dominance chêne*

Concernant le châtaignier, il est souvent de bonne qualité mais également réparti de façon aléatoire. Sur ce type de terrain le châtaignier qui n'est pas optimal pour le développement des châtaigniers, il n'est pas rare de constater des problématiques de roulure (décollement de cernes dans le bois), d'encre ou de chancre. De facto, une éclaircie entrainerai un « pic » de croissance au moment de l'éclaircie ce qui risque d'amplifier ce phénomène de roulure. Ces conditions n'incitent donc pas à améliorer cette essence.

Le mélange avec le robinier est quant à lui cantonné en bordure de parcelle de taillis de robinier ou en bordure de champs. Il est souvent de qualité modeste et varie en fonction de sa localisation. En bref, quand le chêne est de bonne qualité, le robinier l'est également. Sa valorisation principale reste le piquet

**Potentiel :**

- Production de bois de chauffage de chêne et de châtaignier
- Production de piquet de robinier (bois d'industrie)

- **Taillis de robinier**



*Photo 12 : Jeune taillis de robinier*

**Description :**

Le taillis de robinier est le second peuplement présent sur ce massif. Il est souvent dense, mais présente des variations au niveau de sa qualité.

En effet, la partie Nord de la forêt comporte des robiniers peu droits, avec une croissance lente. Les peuplements centraux et sud sont composés d'arbres droits où les croissances sont bonnes.

La valorisation principale de ces peuplements est le piquet, il n'est donc pas recommandé les améliorer.

D'autre part, la croissance juvénile du robinier est meilleure que celle du chêne. C'est pourquoi, il sera de plus en plus présent sur la forêt car il entrera en concurrence avec ce dernier après les coupes de taillis.

**Potentiel :**

- Production de piquet sur la partie Sud et Centrale (bois d'industrie)
- Production de bois de chauffage sur la partie Nord (bois de feu)

- **Taillis de châtaignier**

**Description :**

Les taillis identifiés comme tels sont à dominante de châtaigniers, et sont accompagnés de chêne principalement. Outre cette dominance, sur la partie centrale et nord du massif les régénérations sont ponctuées de nombreuses tâches de châtaigniers. On peut l'expliquer en comparant la croissance juvénile du chêne et du châtaignier. Ce dernier pousse plus vite et entre en concurrence avec le chêne.

Les taillis recensés sont souvent denses et de bonne qualité. Le châtaignier n'est pas facilement améliorable car la réalisation d'une éclaircie accentuera le risque de retrouver des arbres roulés. Cela reste néanmoins un excellent bois pour faire du piquet. En effet, il a les caractéristiques requises telles que la rectitude, le peu de branches et la durabilité de son bois.



*Photo 13 : Taillis à dominance châtaignier*

**Potentiel :**

- Production de piquet et de bois de chauffage

- **Taillis de chêne rouge d'Amérique**

**Description :**

On note la présence de taillis de chênes rouges. Il est composé à 80% de chênes rouges, 10 % de chêne et 10% de châtaigniers. Le taillis est dense, droit. Néanmoins il est très isolé et répartie sur de petites surfaces.

Ces peuplements couvrent de très faibles surfaces. Il ne parait donc pas pertinent de les améliorer.



*Photo 14 : Taillis de chêne rouge d'Amérique*

**Potentiel :**

- Production de bois de chauffage

***Informations complémentaires***

De gros pins maritimes sont éparpillés et sont de gros diamètres. Ces arbres isolés sont souvent difficiles à exploiter et n'apportent pas une réelle plus-value aux parcelles.

Une zone accidentée est notable, là où passait l'ancienne voie ferrée (*voir carte de la desserte en annexe*). Il s'agit de taillis de robinier de part et d'autre du talus. L'exploitation de cette zone est délicate avec la pente mais elle reste néanmoins accessible.




*Photo 15 : Gros pins maritime*

# Conclusion

**Le massif d'Irais est d'une surface boisée d'environ 125 ha. Le chêne est l'essence la plus présente.**

**Le taillis de chêne peut être valorisé le plus souvent en bois de chauffage. Les réserves de qualités peuvent être valorisées en bois d'œuvre**

**Le robinier peut produire du bois de qualité en piquets avec notamment des petits diamètres (10 - 15 cm de diamètre), avec des arbres droits et peu branchus. Il peut également être utilisé en bois de chauffage.**

**Le châtaignier peut être utilisé en piquets dans peu de cas car il est souvent trop gros. Si ce n'est pas le cas, il peut être scié (pour les plus gros diamètres) ou valorisé en bois de chauffage**

**Le chêne rouge d'Amérique peut être valorisé en bois de chauffage.**


**Pour terminer, les pins maritimes présents ne représentent pas des volumes de bois important, par conséquent, leur présence n'entraine pas une réelle plus-value sur les parcelles.**

**Compte tenu des différentes observations, les peuplements présents sur ce massif se trouvent sur des stations de qualité moyenne à bonne.**

**L'éclatement et la disposition des parcelles bloquent certains peuplements qui pourraient être améliorés.**

# Le bois des Patelières

Les boisements présents sur cette zone se déclinent de la manière suivante :




Les peuplements se décrivent comme suit (*voir carte en annexe*):

- **Taillis de robinier**



*Photo 16 : Taillis de robinier*

**Description :**

Dans le bois des patelières, on trouve une part importante de taillis de robinier pur à 90%. D'autres essences sont présentes comme le chêne ou encore le frêne en taillis. D'autres parts des réserves de chênes sont identifiables à l'Est ainsi que des feuillus divers (tilleul).

Le robinier est droit et peu branchu. Sa bonne tenue en extérieure lui assure une bonne valorisation en piquet.

**Potentiel :**

- Production de piquets de robinier

### ➢ Mélange taillis futaie de chêne, frêne et robinier



*Photo 17 : Futaie de chêne*

**Description :**

Un mélange taillis futaie est composé à 50% de chêne, à 30% de frêne et à 20% de robinier.

La futaie est constituée de chênes droits, peu branchus et qui présentent un bon potentiel. Ce boisement est améliorable et pourra produire à terme du bois d'œuvre. Du bois de chauffage sera aussi produit pour les houppiers principalement ainsi que lors des éclaircies.

Le taillis est essentiellement composé de robinier et de frêne. La proportion de frêne est faible et le contexte de cette essence (chalarose, maladie liée à un champignon et mortelle pour l'arbre) n'encourage pas à la réalisation d'une éclaircie.

Le robinier est valorisable en piquet, les frênes présents sont valorisables en bois de chauffage.

**Potentiel :**

- Production de bois d'œuvre de chêne
- Production de piquet de robinier (bois d'industrie)
- Production du bois de chauffage de frêne

### ➢ Taillis de chêne

**Description :**

Ce taillis est composé à 90% de chêne. La densité du peuplement est importante. De plus si on regarde les boisements alentours, on se rend compte que le chêne est de bonne qualité. Une coupe d'amélioration de type détourage permettrait de l'améliorer ce peuplement.

**Potentiel :**

- Production de bois d'œuvre de chêne
- Production de bois de chauffage lors des éclaircies

- **Mélange de taillis robinier-chêne**

**Description :**

Une petite zone est aussi observable en bordure de route. Elle est composée de chêne à 60% et de robinier à 40%. La proportion limitée en chêne ainsi que la surface du peuplement n'encourage pas à la réalisation d'une éclaircie. Le robinier est aussi de même qualité que les autres peuplements et donc valorisable en piquets.

**Potentiel :**

- Production de bois de chauffage de chêne
- Production de piquet de robinier

- **Futaie de chêne**

**Description :**

Pour terminer, une futaie composée de chênes à 80% accompagnés de quelques frênes, et robiniers est présente.

Les chênes sont denses, droits et peu branchus du fait de la concurrence. Ils sont potentiellement améliorables dans l'optique d'obtenir du bois d'œuvre de qualité.

**Potentiel :**

- Production de bois d'œuvre de chêne
- Production de bois de chauffage lors des éclaircies.

# Conclusion

**La surface forestière du bois des patelières est d'environ 20 ha. Le robinier et le chêne sont les principales essences. Ils se trouvent très souvent en taillis ou en mélange taillis futaie.**


**Le chêne peut être valorisé en bois d'œuvre pour les plus belles réserves. Leurs houppiers et le taillis peuvent eux être valorisés en bois de chauffage principalement (allant jusqu'à de la trituration pour les plus petits diamètres).**

**Le robinier peut être valorisé en piquets sur du petit diamètre principalement (10-14 cm) ainsi qu'en bois de chauffage comme les autres essences présentes (tilleul et frêne).**

**Compte tenu des différentes constatations on peut dire que les peuplements se trouvent sur des stations forestières de très bonnes qualités.**

# Le bois de la Praire

Les peuplements rencontrés s'exposent de la manière suivante :




Le bois de la Praire est constitué de deux peuplements (*voir carte en annexe*) :

- **Taillis de chêne**

**Description :**

Dans le bois de la Praire, la grande majorité des peuplements sont des taillis de chêne. Nous nous trouvons sur des sols calcaires peu profonds. Seul le chêne s'adapte convenablement sur ces stations.

On trouve ponctuellement de l'orme non exploitable qui se concentre sur les lisières. Cette essence se fait de plus en plus rare du fait d'un problème sanitaire (la graphiose, maladie obstruant ses canaux conducteurs de sève). Elle demeure intéressante pour la biodiversité de part un mélange d'essences. Le taillis est de qualité bois de chauffage ou de trituration car il est branchu et peu droit. Compte tenu de ses derniers éléments, la réalisation d'une coupe d'amélioration ne parait pas pertinente.

**Potentiel :**

- Production du bois de chauffage de chêne

- **Taillis de robinier**

**Description :**

On note aussi une zone de taillis de robinier. Le taillis présente un faible potentiel avec une mauvaise rectitude et des branches basses. La profondeur du sol et le substrat calcaire sont les principales causes des défauts constatés.

De par sa surface, ce secteur correspond parfaitement pour la réalisation de coupes de bois de chauffage.

**Potentiel :**

- Production de bois de chauffage de chêne et de robinier

***Informations complémentaires***

La zone boisée bordant la route composée essentiellement de taillis de chênes et de quelques robiniers est en pente ce qui rendra plus compliquée l'exploitation des parcelles.

# Conclusion


**Le bois de la Praire représente une surface boisée d'environ 7 ha. Le chêne est l'essence la plus présente.**

**Il s'agit d'un secteur pertinent pour la production de bois de chauffage de chêne. Le robinier présent est de qualité très moyenne et très hétérogène. Sa valorisation n'excédera pas le piquet pour les plus belles tiges.**

**Ces observations montrent que les peuplements se trouvent sur des stations plutôt calcaires où l'on retrouve des sols particulièrement superficiels.**

# Le bois de Moiré

Le bois moiré est composé de 3 peuplements :




Ces peuplements se déclinent de la manière suivante (voir carte en annexe) :

- **Mélange taillis futaie de chêne et robinier**

**Description** :

Ce peuplement est constitué d'un mélange de futaie de chênes pédonculés et d'un taillis de robinier.

Compte tenu de la densité et de la qualité de la futaie de chêne observé elle peut bénéficier d'une éclaircie.

Le taillis de robinier est droit et vigoureux. Il pourra être conduit en taillis pour une bonne valorisation (piquet).

**Potentiel :**

- Production de bois d'œuvre pour le chêne.
- Production de bois de petit diamètre en robinier (débouchés piquet)



*Photo 18 : Mélange taillis futaie de chêne et robinier*

- **Taillis de robinier**



*Photo 19 : Taillis de robinier*

**Description :**

Les 2 poches de taillis sont représentées par 90% de robinier. En plus du robinier, on trouve quelques cépées d'érable champêtre réparties de façon éparses sur la partie Est de la forêt.

L'érable champêtre est présent en élément de diversification (bordure de voie ferrée (*voir carte de la desserte en annexe*))

**Potentiel :**

Production de bois de petit diamètre en robinier (piquet).

- **Mélange de taillis divers**

**Description :**

Le mélange de taillis divers est composé de robinier à 40%, du chêne à 30% ainsi que du châtaignier et de l'érable à 15% chacun.

Dans ce peuplement, on trouve quelques réserves de chênes réparties de façon éparses, plutôt en lisière.

Le mélange d'essence étant important et sur des petites surfaces, il n'est pas pertinent d'améliorer ce type de boisement. De plus, les réserves de chênes sont de qualité moyenne du fait de leur branchaison importante.

**Potentiel :**

- Production du bois de chauffage pour le chêne, le châtaignier et l'érable.
- Production de bois d'industrie pour le robinier (piquet)

# Conclusion

**Le bois de Moiré couvre une surface boisée d'environ 3 ha. Le robinier et le chêne sont les essences majoritaires. Il s'agit principalement de taillis et mélange taillis futaie de qualité moyenne à bonne.**

**Le chêne est valorisable en bois d'œuvre pour les plus belles réserves. Leurs houppiers peuvent eux être utilisés pour du bois de chauffage ou du bois d'industrie.**

**Le robinier peut être valorisé en piquets sur du petit diamètre principalement (10-14 cm), le reste sera utilisé en bois de chauffage comme l'érable champêtre.**

**Compte tenu des différentes observations, on peut dire que les peuplements se trouvent sur des stations de bonnes qualités.**

# Conclusion

Cette synthèse forestière met bien en évidence la diversité des boisements présents sur cette zone d'étude.

Les boisements évoluent sur des substrats différents d'une commune à l'autre ce qui entraine des disparités de croissance et des valorisations différentes (bois de feu, bois d'industrie et bois de travail).

La qualité des essences est variable suivant le massif où elles se situent.

Le chêne est l'essence la plus représenté. On le retrouve principalement en taillis. Le robinier faux acacia est également bien représenté. Plus ponctuellement, on trouve également des zones de châtaignier, de charme ou encore de pins.

Cette synthèse n'est pas exhaustive. La description ne s'attache pas à décrire les boisements à l'échelle des parcelles cadastrales. Il s'agit de par ce bilan de mettre en évidence les différentes potentialités forestières des boisements avec le potentiel d'avenir des boisements en place. Ainsi, cette distinction permettra au géomètre, et in fine, aux propriétaires de pouvoir trouver des compromis dans leurs projets d'échange ou de vente de parcelles.

# Listes des annexes

Page 1 : Carte des peuplements de la forêt de Saint Généroux

Page 2 : Carte des peuplements de la forêt d'Irais

Page 3 : Carte des peuplements du bois des Patelières

Page 4 : Carte des peuplements du bois de la Praire

Page 5 : Carte des peuplements du bois de Moiré

Page 6 : Carte des zones de taillis plus pauvres sur la forêt de Saint Généroux

Page 7 : Carte de la desserte de la forêt de Saint Généroux

Page 8 : Carte de la desserte de la forêt d'Irais

Page 9 : Carte de la desserte du bois des Patelières

Page 10 : Carte de la desserte du bois de la Praire


Page 11 : Carte de la desserte du bois de Moiré

Page 12 : Glossaire

DEUX-SÈVRES
LE DÉPARTEMENT

# Carte des peuplements de la forêt de Saint Généroux


CNPF
Centre Régional de la Propriété Forestière
NOUVELLE-AQUITAINE



DEUX-SÈVRES
LE DÉPARTEMENT

# Carte des peuplements de la forêt d'Irais

CNPF
Centre Régional
de la Propriété Forestière
NOUVELLE-AQUITAINE





Sources : IGN; CNPF; Réalisé le 26/02/19

DEUX-SÈVRES
LE DÉPARTEMENT

# Carte des peuplements du bois des Patelières

CNPF
Centre Régional
de la Propriété Forestière
NOUVELLE-AQUITAINE





Sources : IGN; CNPF;
Réalisée le 26/02/19

DEUX-SÈVRES
LE DÉPARTEMENT

# Carte des peuplements du bois de Moiré

CNPF
Centre Régional
de la Propriété Forestière
NOUVELLE-AQUITAINE




Sources : IGN; CNPF;
Réalisée le 26/02/19


CNPF
Centre Régional
de la Propriété Forestière
NOUVELLE-AQUITAINE

# Carte des peuplements du bois de la Praire


DEUX-SÈVRES
LE DÉPARTEMENT




# Carte des zones de taillis plus pauvres sur la forêt de Saint Généroux



# Carte des dessertes de la forêt de Saint Généroux



# Carte des dessertes de la forêt d'Irais




**Légende**

- Limites

**Type de peuplement**

- Taillis
- Mélange taillis futaie

**Essence dominante**

- Chêne rouge d'Amérique
- Châtaignier
- Robinier
- Chêne

**Desserte**


- Route
- Route forestière
- Chemin
- Ancienne voie ferrée

**Sources : IGN; CNPF; Réalisé le 26/02/19**


# Carte des dessertes du bois des Patelières

DEUX-SÈVRES
LE DÉPARTEMENT


CNPF
Centre Régional
de la Propriété Forestière
NOUVELLE-AQUITAINE



# Carte des dessertes du bois de la Praire



# Carte des dessertes du bois de Moiré




Sources : IGN; CNPF;
Réalisée le 26/02/19

# Glossaire

**CRPF :** Centre Régional de la propriété forestière

**Futaie :** Ensemble d'arbres issus de semis

**IGN :** Institut Géographique National

**Taillis :** Ensemble de tiges issues de rejets de souches